

Mon enfant a mal à l'oreille

URGENCES ORL

Les fiches « SOS ORL » ont été rédigées par les médecins spécialistes ORL dans le but d'aider un patient ou son entourage à prendre les bonnes décisions dans une situation d'urgence concernant l'ORL.

Il s'agit de conseils, qui ne substituent pas à l'avis médical immédiat, dans l'idéal toujours nécessaire. Dans certains cas graves, des gestes simples sont proposés pour rétablir une situation critique, permettant de patienter jusqu'à l'arrivée des secours.

Circonstances	Signes ressentis	Signes de gravité	Diagnostic présumé	Action	Faire Ne pas faire
Après un traumatisme ou une gifle	Douleurs	Vertiges Saignement de l'oreille Surdité	Perforation du tympan	Médecin traitant ORL	Ne pas mettre de gouttes ou de liquide dans l'oreille
Au cours d'une rhinopharyngite aiguë ou d'un gros rhume	Fièvre Pleurs nocturnes	Fièvre élevée, Pleurs permanents Age inférieur à 2 ans Écoulement	Otite moyenne aiguë	Médecin ORL	Traiter la fièvre et la douleur en attendant la consultation (paracétamol par exemple)
Il est déjà traité pour otite depuis 48 h	Douleurs persistantes Écoulement d'oreille	Fièvre persistante Perte d'appétit Altération de l'état général Gonflement derrière l'oreille	Otite compliquée, voire mastoïdite	Reconsulter en urgence	Croire que cela va guérir tout seul
Après des baignades	Douleurs intenses, notamment dès qu'on touche l'oreille Écoulement oreille	Conduit auditif rétréci Gonflement derrière l'oreille	Otite externe	Médecin traitant ORL	Arrêter les baignades Pas de gouttes ou de nettoyage de l'oreille au coton tige
Après nettoyage par coton-tige	Oreille bouchée	Douleurs intenses Conduit auditif rétréci	Bouchon de cérumen	Médecin traitant ORL	Ne pas essayer de se déboucher tout seul

Circonstances	Signes ressentis	Signes de gravité	Diagnostic présumé	Action	Faire Ne pas faire
L'enfant s'est mis ou on lui a mis un corps étranger dans l'oreille	Simple gêne ou douleurs si profond	Ecoulement saignement Baisse d'audition voire vertige si pénétration très profonde	Pas toujours évident si l'enfant n'avoue pas l'incident (ce qui est fréquent)	ORL pour extraction	Ne pas tenter de l'enlever ni de faire un lavage d'oreille

Ces fiches ont été rédigées par les experts de la Société Française ORL et CCF

Coordonateurs : E. Serrano J-M Juvanon

Rédacteurs : Barry B. Beauvillain C. Bessede J-P. Beutter P. Bobin S. Bonfils P. Brasnu D. Castillo L. Coste A. Crampette L. Debry C. Deguine O. Dehesdin D. Denoyelle F. Dessi P. Disant F. Dubin J. Dubreuil C. Garabedian N. Gentine A. Guerrier B. Jankowski R. Klossek J-M. Kossowski M. Le Clech G. Manach Y. Mariakowski R. Marie J-P. Martin C. Mom T. Mondain M. Perié S. Pessey J-J. Pignat J-C. Prades J-M. Reyt E. Robier A. Romanet P. Sauvage J-P. Strunski V. Triglia J-M.