

## Abstract

- Le carcinome papillaire de la thyroïde est une tumeur épithéliale maligne, constituée de cellules à différenciation vésiculaire, d'architecture papillaire et vésiculaire, avec des altérations nucléaires caractéristiques.
- C'est de loin la plus fréquente des tumeurs malignes thyroïdiennes, elle survient à tout âge (enfant, adulte, sujet âgé), avec une nette prédominance féminine. Et elles sont généralement associées à un pronostic favorable.
- Toutefois, les cancers de la thyroïde du sexe masculin sont des formes peu fréquentes, caractérisés par leur agressivité et leur fréquente association à des métastases locorégionales ou à distance.

## Objectifs

L'objectif de notre travail est de déterminer les caractéristiques épidémiologiques et histo pronostiques du carcinome papillaire de la thyroïde (CPT) chez les hommes.


## Méthodes et Matériels

- Etude rétrospective descriptive analytique utilisant le logiciel SPSS
- Cent soixante dix patients ayant un carcinome papillaire de la thyroïde dont 40 de sexe masculin suivi à notre service sur une période de 6 ans (2018 -2023).

## Résultats

### Caractéristiques générales des patients

	nombre	Pourcentage
Age (ans)	46 ans	
Antécédents des néoplasies dans la famille	3	7,5%
Durée d'évolution (mois)	12	
Motif de consultation le plus fréquent (nodule solitaire)	14	35%



■ hommes ■ femmes

## Caractéristiques clinico-pathologiques

- Tous nos patients ont eu une **thyroïdectomie totale sur un ou deux temps**,

- Au suivi** Une localisation secondaire (pulmonaire) a été diagnostiquée chez 7.5% des patients.

Les récurrences ganglionnaires ont été retrouvées chez 25 % des patients. Un seul cas de décès a été noté,

Le recul moyen dans notre étude était de 36 mois



Fig1 : image per opératoire d'une thyroïdectomie totale chez un Homme

	Nombre	pourcentage
Type histologique : carcinome papillaire	40	100%
Curage ganglionnaire récurrentiel	40	100%
Curage ganglionnaire latéral	8	20%
Complément d'irathérapie	32	80%

## Facteurs pronostiques du cancer thyroïdien du sexe masculin

	Pourcentage	P
Tumeur localement avancées	65%	0,02
Tumeur multifocale	80%	0,01
Présence des embolies vasculaires	14,6%	0,04
Présence des métastases ganglionnaires récurrentielles	50%	0,02
Présence des métastase sganglionnaires latérales	10%	0,03

## Conclusion

- Les cancers thyroïdiens du sujet masculin sont des formes rares et agressives.
- Leur impact pronostique majeur affecte leur prise en charge ultérieure comme signalé dans la littérature
- Nos résultats rejoignent ceux de la littérature mettant en évidence le sexe masculin comme un facteur aggravant surtout si associé à d'autres facteurs de risque tels que la multifocalité,
- Le pronostic post-opératoire était significativement corrélé aux métastases locorégionales ou à distance lors du diagnostic ( p=0,02)

## Références

- 1/ Lalya ; Association carcinome médullaire et carcinome papillaire de la thyroïde (à propos d'un cas et revue de la littérature),Revue marocaine du cancer, 2006; 386-387
- 2/H Aschawa, O Belaqiz - Facteurs histopronostiques du cancer différencié de la thyroïde chez l'homme: étude d'une série de cas traités au CHU de Casablanca ; Médecine Nucléaire, 2024 – Elsevier ; 79