

Otitis moyennes aiguës compliquées: caractéristiques et prise en charge

Jihène Houas 1, Heyfa Belhadj-Miled 1, Monia Ghammam 1, Mouna Bellakhder 1, Malika El Omri , Abir Meherzi 1, Wassim Kermani 1, Mohamed Abdelkefi 1
Service ORL & Ccf – CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie

But de la présentation

L'otite moyenne aiguë est le résultat d'infections virales ou bactériennes dans l'oreille moyenne. Malgré l'utilisation fréquente d'antibiotiques pour différentes raisons, elle peut encore entraîner de graves complications. Bien que l'otite moyenne aiguë soit plus fréquente entre 3 mois et 3 ans, elle peut être observée chez les adultes et peut même entraîner des complications graves.

But de la présentation

Etudier les caractéristiques épidémiologiques et cliniques et la prise en charge thérapeutique des otites moyennes aiguës (OMA) compliquées.

Méthodes et Matériels

Etude rétrospective rapportant une série de 18 observations d'OMA compliquées colligées à notre service sur une période de 13 ans allant de 2010 à 2023.

Résultats

- **L'âge** variait entre 10 mois et 58 ans.
- **Le motif de consultation** était :
 - une fièvre dans 8 cas,
 - une otorrhée unilatérale dans 11 cas,
 - une tuméfaction rétro-auriculaire dans 13 cas,
 - une asymétrie faciale 6 cas.
- **La durée d'évolution des symptômes** variait entre 2 jours et 3 semaines.
- **Un scanner des rochers** a été fait dans 9 cas et **cérébral** dans 3 cas.
- **Les complications notées** étaient:
 - une oto-mastoïdite 13 cas,
 - une paralysie faciale périphérique dans 6 cas,
 - une thrombophlébite du sinus latéral dans 3 cas
 - un abcès de la fosse postérieure dans un seul cas.
- **Un traitement antibiotique** a été instauré chez tous les patients (probabiliste au début et adapté selon l'antibiogramme par la suite).
- **Un traitement chirurgical** a été réalisé dans 10 cas.
- **L'évolution** a été favorable chez tous les patients.



Fig1 aspect clinique d'une mastoïdite décollement du pavillon et comblement du sillon rétro auriculaire



Fig_2: TDM des rochers comblement des cavités de l'oreille moyenne et des cellules mastoïdiennes avec collection sous cutanée

Conclusion

Malgré les approches préventives et thérapeutiques avancées, les patients atteints d'otite moyenne aiguë peuvent toujours présenter des complications. Contrairement à ce que l'on croit, elle peut être observée non seulement chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Les complications des OMA peuvent être graves et engager le pronostic vital ou laisser de lourdes séquelles. L'imagerie est d'une grande aide au diagnostic. Le traitement comporte un traitement antibiotique parentéral adapté associé ou non à un traitement chirurgical.